

# KINSIDRO™ NUTRI

## INGRĂȘĂMÂNT EC

Amestec solid de micronutrienți cu Bor (B), Cobalt (Co), Cupru (Cu), Fier (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo) și Zinc (Zn).

Bor (B) solubil în apă	0.40%	
Cobalt (Co) solubil în apă	0.85%	
Cobalt (Co)	0.80%	chelată cu EDTA
Cupru (Cu) solubil în apă	0.81%	
Cupru (Cu)	0.81%	complexat cu LS
Cupru (Cu)	0.71%	chelată cu EDTA
Fier (Fe) solubil în apă	0.73%	
Fier (Fe)	0.72%	complexat cu LS
Fier (Fe)	0.68%	chelată cu DTPA
Mangan (Mn) solubil în apă	1.09%	
Mangan (Mn)	1.08%	complexat cu LS
Mangan (Mn)	0.81%	chelată cu EDTA
Molibden (Mo) solubil în apă	0.34%	
Zinc (Zn) solubil în apă	0.74%	
Zinc (Zn)	0.74%	complexat cu LS
Zinc (Zn)	0.70%	chelată cu EDTA

Stabil la pH 3,5 - 8

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.



GHS07



GHS08

### Atenție

Suspectat de a provoca cancer

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

Evitați să respirați praful.

Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi, protecție pentru față.

**ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** Spălați cu multă apă.

Dacă sunteți expus sau îngrijorat: Solicitați sfatul medicului.

Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

EUH208 - Conține etilendiaminetetraacetat de cobalt disodic. Poate produce o reacție alergică.

EUH210 - Fișă tehnică de securitate disponibilă la cerere.

Tel de urgență: 1-352-323-3500 // 112  
Număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112.

#### Recomandări pentru utilizare:

Kinsidro™ Nutri este solubil în apă și se aplică foliar, iar utilizarea sa este compatibilă cu majoritatea îngrășămintelor și produselor de protecție a culturilor (pentru mai multe informații, contactați furnizorul dumneavoastră).

Pentru amestecare, adăugați încet Kinsidro™ Nutri într-un rezervor de amestecare parțial umplut cu apă. Adăugați apa rămasă și celelalte componente ale amestecului în rezervor conform instrucțiunilor producătorului, permițeti amestecarea uniformă prin agitare. Mențineți agitarea. Pentru amestecuri în rezervor cu alte componente necunoscute, efectuați întotdeauna un amestec de testare.

Nu aplicați dacă sunt așteptate ploi în decurs de 3 ore.

Kinsidro™ Nutri se aplică o dată pe sezon în vegetație.  
Aplicați 150gr de Kinsidro™ Nutri în 150 – 300 L apă/ha

Cultura	Doza	Momentul aplicării
Porumb	150g/ha	2-6 frunze ale culturii
Cereale de iarnă	150g/ha	2-3 frunze ale culturii, toamna
Cereale de primăvară	150g/ha	Stadiul de alungire internodii (BBCH25) primăvara
Floarea soarelui	150g/ha	2-4 frunze ale culturii
Rapița de iarnă	150g/ha	2-4 frunze ale culturii, toamna
Sfecla de zahăr	150g/ha	O dată cu prima sau a doua erbicidare
Soia	150g/ha	4-6 frunze ale culturii
Orez	150g/ha	Stadiu înfrățire (BBCH21-29)
Cartof	150g/ha	Când plantele au o înălțime de 10 cm.
Tomate pentru industrializare	150g/ha	De la stadiul de 2-6 frunze până la înflorire / apariția fructelor
Bumbac	150g/ha	De la stadiul de 2-6 frunze până la înflorire

Distribuit de:

**Corteva Crop Solutions ROM S.R.L**

Șos. București-Ploiești, Nr. 42-44  
Băneasa Business Technology Park  
Clădirea B, Et. 2, 013696  
București, Sector 1  
Tel: +40(0)31 620 4100 (recepție)  
Fax: +40(0)31 620 4101

Deținător omologare / Producător:

**Pro Farm OÜ**

Keevise 10, 11415 Tallinn, Estonia  
info@profarm.org // +358 9817116 30

Număr lot: XXX

Greutate neta: 300g, 1kg

UFI xxxxxx