SCHAWK!

CM 613 DIA

Dow AgroSciences

Package MID :	282666BOX 1711
Trade Name :	KERB 50W
Country :	ROMANIA
Size :	160X95X260X160MM
Artwork Type :	1KG BOX INNER
Specification :	CM 613 DIA
Standardisation Level :	1
Printer :	EMEA - DIACHEM
Packing Location :	EMEA - DIACHEM CARAVAGGIO (F458-F492)
Ticket No :	601158A01/512660
Date :	18-NOV-17
Proof Cycle No :	1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 5

Black | PANTONE 151 C | PANTONE 348 C | PANTONE 185 C | PANTONE 485 C

95mm

260mm

GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE
Fraze de pericol
H351: Susceptibil de a provoca cancer.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Declarații de pericol suplimentare
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
Fraze de precauție
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P281: Utilizați echipamentul de protecție individuală, conform cerințelor.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.
Conține Propyzamide

Dow AgroSciences

Kerb™ 50W

ERBICID

Erbicid sistemic, selectiv, folosit pentru combaterea buruienilor monocotile anuale, unele monocotile perene, precum si a unor buruieni dicotiledonate (inclusiv cuscuta) din culturile de lucerna, trifoi, salata, sfecla de zahar.

Continut:
Substanta activa: 50 % propizamid

Formulare: pulbere umectabila

Omologat in Romania cu Certificatul de Omologare nr. 153/14.05.1974

Detinatorul omologarii: Dow AgroSciences LLC SUA,
9330 Zionsville Rd.,Indianapolis 46268, USA.
Producator/ Furnizor: Dow AgroSciences LLC S.U.A.
9330 Zionsville Rd., Indianapolis 46268, S.U.A.
Reprezentat in Romania prin: Dow AgroSciences Export SAS
Reprezentanta Bucuresti, Bucharest Business Park,
Sos. Bucuresti Ploiesti Nr.1A,
Corp A, Intrarea B, Parter, Cod 013681 Sector 1, Bucuresti
Tel.021 4041570; 021 4041571; 021 4041572
Fax. 021 4041551

Tel de urgenta SGS Romania : +40 744 34 14 53

Ambulanta/Politie/Pompieri: Tel.112
Centrul de informare toxicologică - Institutul Național de Sănătate Publică: +4021 318 36 06 sau +40 21 318 36 20, interior 235 (orele 8.00-15.00).

Lot nr. : a se vedea marcajul de fabrica de pe ambalaj.
Data fabricatiei: conform cu marcajul de fabrica de pe ambalaj
Termen de valabilitate : 2 ani de la data fabricatiei.

Informatii privind transportul:

Transport rutier/feroviar ADR/RID:	Clasa: 9	Nr.UN: 3077
Transport maritim IMDG:	Clasa: 9	Nr.UN: 3077
Transport aerian ICAO / IATA :	Clasa: 9	Nr.UN: 3077

Mostrele nu se expediaza prin posta

A se utiliza numai in scopul pentru care a fost omologat si in conformitate cu instructiunile alaturate.
Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu conditia respectarii recomandarilor din prezenta.

SCAPA

e 1 Kg

®™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow



GHS08 GHS09

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE
Fraze de pericol
H351: Susceptibil de a provoca cancer.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Declarații de pericol suplimentare
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
Fraze de precauție
P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P281: Utilizați echipamentul de protecție individuală, conform cerințelor.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.
Conține Propizamid

Dow AgroSciences

Kerb™ 50W

ERBICID

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
Kerb 50 W este o pulbere fina, omogena, fara tendinta de aglomerare, de culoare crem. Contine 50 % propizamid.

MOD DE ACTIUNE
Erbicid sistemic, selectiv, folosit in pre/postemergenta, pentru combaterea buruienilor monocotile anuale, unele monocotile perene, precum si a unor buruieni dicotiledonate din culturile de lucerna, trifoi, salata, sfecla de zahar si molid (pepiniere). Asigura o combatere foarte buna a cuscutei in conditiile aplicarii unei tehnologii corespunzatoare.
Kerb 50 W actioneaza prin absorbtie radiculara. De aceea, pentru a asigura o combatere eficienta a buruienilor, este important ca dupa aplicarea tratamentului, solul sa aiba o umiditate suficienta (prin ploaie sau irigare)

MOD DE INTREBUINTARE
Kerb 50 W este omologat la urmatoarele culturi si la urmatoarele doze:

Cultura	Doza
lucerna (veche): buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene	4-5 kg/ha
trifoi (vechi)	4-5 kg/ha
salata	2-3 kg/ha
sfecla de zahar:*Cuscuta spp.*	4 kg/ha
molid (pepiniere)	5 kg/ha

Spectrul de buruieni combatute:
Buruieni monocotiledonate: Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Agropyron repens, Bromus spp., Dactylis glomerata, Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Setaria spp.

Buruieni dicotiledonate: Amaranthus spp., Stellaria media, Chenopodium album, Cuscuta spp., Capsella bursa pastoris, Raphanus raphanistrum, Thlaspi arvense, Equisetum arvense, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Urtica spp., Veronica spp.

Momentul aplicarii
In cazul **culturilor de lucerna si trifoi**, pentru combaterea cuscutei, Kerb 50 W se aplica primavara devreme (dupa prima coasa), cand cuscuta incepe sa germineze. Combaterea buruienilor este favorizata in cazul in care, dupa aplicarea erbicidului, se inregistreaza precipitatii. Pentru combaterea celorlalte buruieni sensibile la propizamid, Kerb 50 W poate fi aplicat toamna, in preemergenta (zone ploiase sau cu posibilitati de irigare) sau primavara in pre/postemergenta cat mai timpuriu (buruienile pana in faza de 2 frunze).
La **salata** se poate aplica preplant sau la 7-10 zile de la transplantare, inainte de aparitia buruienilor. In lipsa precipitatiilor, este necesara irigarea terenului pentru a optimiza eficacitatea produsului. Este important sa se respecte timpul de pauza de 6 saptamani pana la recoltare.
La **sfecla de zahar** se aplica in stadiul de 6-8 frunze, la aparitia primelor semne de infestare cu cuscuta. Se recomanda folosirea unui volum ridicat de apa de 500-600 l/ha.
In cazul **pepinierelor de molid**, se pot face tratamente cu Kerb 50 W nu mai tarziu de 1 luna dupa transplantat.

Timpul de pauza pana la recoltare: 6 saptamani

Restrictii privind rotatia culturilor:
Culturile de salata, fasole, mazare, ridichi, trifoi, lucerna pot fi infiintate imediat dupa recoltarea culturilor la care s-a folosit Kerb 50 W.
La 4-5 luni dupa aplicarea Kerb 50 W se pot cultiva ceapa, usturoi, cartofi, varza, tomate, ardei, alte culturi legumicole, floarea-soarelui.
La 9-10 luni dupa aplicarea Kerb 50 W se pot cultiva cereale si porumb.

COMPATIBILITATE
In preemergenta, poate fi aplicat in amestec cu alte erbicide omologate. In postemergenta nu se recomanda combinarea cu alte produse.
Pentru o mai mare siguranta se va consulta lista de combatibilitate si se va face un test practic.

MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu pielea si ochii. In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca, nu se fumeaza.
Dupa terminarea lucrului, se spala mainile si fata cu multa apa si sapun.
In cazul contaminarii ochilor sau pielii, spalati cu multa apa si solicitati sfatul medicului.
In caz de ingestie, nu induceti voma. Beti cantitati mari de apa si apelati la serviciile medicului. Decizia asupra necesitatii inducerii vomei apartine medicului.
Imbracamintea contaminata trebuie sa fie inlaturata imediat si curatata prin spalare.
A nu se lasa produsul la indemana copiilor.
A nu se contamina apa, alimentele, furajele.

Nota pentru medic:
Tratament de întreținere. Tratamentul este bazat pe cunoștințele medicului și este direcționat asupra simptomelor prezentate de pacient.
In caz de contaminare cu produs, se recomanda a se contacta:
Institutul National de Sanatate Publica –Biroul de informare toxicologica Tel..021 318 3620/interior 235

MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI
Deoarece substanta activa este toxica pentru organismele acvatice, produsul se va aplica conform tehnologiilor si instructiunilor de utilizare aprobate, cu respectarea masurilor speciale pentru protectia apelor, conform prevederilor legale.
Nu se aplica pe terenuri agricole adiacente cursurilor de apa. Pentru evitarea contaminarii apei, produsul trebuie aplicat la o distanta de 15 m de suprafetele acvatice.
Sa se previna prin orice mijloace ca produsul sa ajunga in apele de suprafata.

MASURI DE ELIMINARE A AMBALAJELOR GOALE:
După golire, ambalajele de plastic și metal vor fi decontaminate prin tripla clătire, golite de conținut, uscate, curate și pastrate cu capacele separate, iar apa rezultată se va adauga la soluția de stropit. Ambalajele de hartie, saci sau cutii, vor fi curatate si compactate.
Ambalajele inscriptionate cu sigla SCAPA – Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al Asociatiei Industriei de Protectia Plantelor din Romania vor fi colectate
gratuit prin centrele zonale de colectare SCAPA.
Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro / www.rigk.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
In caz de incendiu se va folosi ca agent de stingere: ceata de apa, spray-uri, bioxid de carbon, pulbere chimica uscata, spuma. Se vor lua masuri de prevenire a contaminarii apei freatice si solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Se va folosi masca pentru protectia impotriva fumului. In timpul unui incendiu, fumul poate contine materialele initiale pe langa produsele de combustie in compozitie diversa ce poate fi toxica si/sau iritanta. Produsele de combustie includ: oxizi de carbon, acid clorhidric, oxizi de azot.

MASURI IN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE
Produsul imprastiat accidental se va curata cu nisip, care se va colecta in containere specifice ce vor fi distruse in aceleasi conditii ca si ambalajele goale. Se va purta echipament de protectie.

CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT
Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi uscate, destinate in exclusivitate produselor de uz fitosanitar, fara actiunea directa a razelor solare si caldurii, separat de alimente sau furaje. In timpul manipularii, transportului si depozitarii, se respecta obligatoriu toate masurile de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor. Temperatura de depozitare este intre + 5° si 30°C.

IN ATENTIA UTILIZATORULUI
Producatorul isi declina orice responsabilitate fata de prejudiciile datorate depozitarii, manipularii sau utilizarii neconforme cu recomandarile din aceasta etichета.
Relatii suplimentare referitoare la utilizare si orice informatii tehnice se pot obtine de la Reprezentantii Dow AgroSciences, la telefoanele: **0744 649657; 0752 139544; 0752 139545; 0758 101862; 0751 282166.**

®™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

282666BOX1711

95mm | 160mm | 95mm | 160mm

510mm